

si proprio, desvia-se da direcção regular inclinando-se para um ou outro lado; recuar é-lhe quasi impossivel.

O pulso é normal ou lento, ás vezes intermittente, e a respiração calma; a digestão faz-se com morosidade e as defecações são raras e abundantes.

A — immobilidade — varia consideravelmente; assim os symptomas são pouco intensos no repouso e durante um trabalho ligeiro, enquanto que se tornam mais salientes nas andaduras acceleradas e quando o animal é aquecido fortemente; é mais frequente no estio do que no inverno, chegando n'esta estação a doença a passar quasi desapercibida; as cavallariças quentes e pouco arejadas, o uso d'alimentos de difficil digestão e tudo o que seja capaz de provocar uma congestão na cabeça, exacerba o estado do animal affectado.

A immobilidade póde surgir espontaneamente e desenvolver-se pouco a pouco, ou apparecer como consequencia da — encephalite —; e n'este ultimo caso é mais grave.

Os cavallos grandes, molles, d'um crescimento rapido e cabeça *acarneirada* são predispostos a esta doença, que entra no numero das affecções hereditarias. Suas causas occasionaes são todas as que produzem a encephalite, ás quaes é preciso juntar a equitação forçada.

A immobilidade póde manter-se durante annos com alternativas de melhora e aggravamento; seus progressos são geralmente lentos a menos que se não submetta o animal a condições hygienicas desfavoraveis; a cura radical constitue um factio raro.

Tratamento. — Uma medicação activa só é util no debute ou durante a aggravação da molestia; começa-se por uma sangria geral pouco copiosa e administra-se o — sulphato de soda — na dose de 50 grammas por dia, ao qual se deverá juntar o *nitro* na dose de 25 grammas no caso de congestão cerebral e de vertigem furiosa; em seguida, os purgantes drásticos e os clystéres excitantes, tendo aquelles por base o *aloes*, e estes a *infusão de tabaco*; finalmente os revulsivos applicados ao pescoço e ás coxas e a *valeriana* associada á *asafetida* internamente, na dose de 30 grammas da 1.^a e 5 da 2.^a por dia, a cada cavallar adulto.

O regimen hygienico é um ponto importante para o tratamento da — immobilidade — que deve consistir no seguinte: alojamento fresco e ventilado; um trabalho moderado, lento e não forçado; o repouso absoluto durante a exacerbação do mal; exposição ao ar livre, á chuva, mesmo de noute, tendo o cuidado de garantir o doente dos raios do sol; alimentos refrigerantes, pouco feno e uma ração moderada de cevada.

G. JOÃO DE SÁ.

