



INSPECÇÃO DA CARÇAÇA

Auxiliar de memória para os requisitos obrigatórios na inspecção *post-mortem* da carcaça

	BOVINOS	EQUINOS	OVINOS E CAPRINOS	SUINOS
GERAL	Exame das carcaças (superfícies muscular e óssea expostas, articulações e bainhas dos tendões) para determinar a existência de qualquer doença ou defeito. Deve ter-se em atenção o estado de carnes, a eficácia da sangria, a cor, o estado das membranas serosas (pleura e peritoneu) e ainda a presença de contaminação fecal visível e a presença de qualquer odor estranho			
LINFONODOS Inguinais superficiais Íliacos Peitorais Poplíteos Renais CARÇAÇA	palpação (a) palpação palpação palpação dividida (b)	palpação palpação palpação palpação dividida	palpação palpação palpação palpação	palpação (a) palpação palpação dividida (c)
OUTROS		incisão do Ln subromboide e do músculo subescapular nos cavalos ruços ou brancos		

NOTAS

- (a) Incisão na porca e na vaca. Nas vacas não é obrigatório se a glândula mamária for excluída do consumo humano
- (b) Apenas é obrigatório para bovinos com mais de seis meses
- (c) Apenas é obrigatório para suínos com mais de quatro semanas

INSPECÇÃO DAS VÍSCERAS

Auxiliar de memória para os requisitos obrigatórios na inspecção *post-mortem* das vísceras

	BOVINOS	EQUINOS	OVINOS E CAPRINOS (Inclui cordeiros)	SUINOS
LINFONODOS Mesentéricos Retro-hepáticos Brônquicos e Mediastínicos	Exame visual Incisão (a) Incisão (a)	Exame visual Palpação Incisão	Exame visual Palpação Palpação	Palpação (b) Palpação Palpação
APARELHO GASTRO-INTEST. BAÇO	Exame visual Palpação	Exame visual Palpação	Exame visual Exame visual	Exame visual Exame visual
FÍGADO	Palpação. Exame visual da vesícula biliar (não se aplica a equídeos). Nos bovinos com mais de seis semanas, deve se efectuada uma incisão para detectar a presença de tremátodos no fígado.			
PULMÕES	Palpação. Incisão transversal no lobo diafragmático para abrir os brônquios. Deve ser aberta a laringe, traqueia e as principais ramificações brônquicas.			
CORAÇÃO	Exame visual, depois de rebatido o pericárdio. Incisão longitudinal de modo a abrir os ventrículos e atravessar o septo interventricular.			
RINS	Exame visual, após a enucleação e necessário incisão. Nos cavalos ruços ou brancos, incisão do rim inteiro.			
UTERO (adultos)	Palpação	Exame Visual	Exame Visual	Exame Visual

- (a) Nos bovinos com menos de seis semanas apenas é obrigatório o exame visual
- (b) Se deve praticar-se a incisão, sempre que necessário e nos suínos também, caso se tenham observado
- lesões nos linfonodos submaxilares

