





# Cartografia do coberto arbóreo por espécie florestal com imagens Quickbird utilizando segmentação multi-resolução e classificação orientada a objecto

Adélia Maria O. de Sousa<sup>a 1</sup>, Paulo Mesquita <sup>2</sup>, José Rafael Marques da Silva<sup>a 3</sup>

<sup>a</sup>Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, Departamento de Engenharia Rural Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal, asousa@uevora.pt¹, paulomesquita00@gmail.com², jmsilva@uevora.pt³







### Objectivo:

O objectivo deste estudo foi avaliar o potencial de imagens de alta resolução espacial (Quickbird) na identificação de espécies florestais para uma região do Alentejo (Figura 1), utilizando as novas Tecnologias de Informação Geográfica.

#### Dados:

Neste estudo, foi utilizada uma imagem multiespectral, com as bandas correspondente aos comprimentos de onda do espectro eletromagnético do azul (b1), verde (b2), vermelho (V) (b3) e infra-vermelho próximo (IVP) (b4) do satélite Quickbird com uma resolução espacial de 0,70 cm (pan-sharpened).




#### Metodologia:

Numa primeira abordagem aos dados, procedeu-se à georreferenciação da imagem com base em pontos identificados no campo com um Sistema de Posicionamento Global (GPS) e em vértices geodésicos identificáveis na imagem.

Foi testado o método de segmentação multi-espetral e de classificação orientada por objecto, presente no programa ENVI EX e Definiens Developer (versão 8.0.1). Na aplicação deste método foram seguidas 4 etapas: 1) cálculo do NDVI, 2) criação de uma máscara de vegetação, 3) segmentação da vegetação em objectos homogéneos e 4) classificação.

- 1) Cálculo do índice de vegetação Normalized Difference Vegetation Index, NDVI= (IVP V)/(IVP+V) (Figura 2). Este índice foi utilizado como banda adicional, com o objectivo de diminuir os problemas na discriminação da vegetação arbórea relativamente ao solo e arbustos de pequenas dimensões, resultantes da resolução espectral limitada do satélite Quickbird.
- 3) Com vista à diferenciação entre espécies, foi executada uma segmentação multi-resolução para a área correspondente à máscara de vegetação com base em critérios aplicados à banda do IVP. Foi definida a legenda com base nas espécies presentes (Quercus Suber e Pinus Pinea), confirmadas em trabalho de campo, onde se recolheu informação que serviulpara a extracção de áreas de treino para o processo de classificação.



- 2) Com base no NDVI, procedeu-se à obtenção de uma máscara de vegetação através do método de segmentação utilizando um limiar que maximiza o contraste entre regiões na imagem.
- 4) No processo de classificação digital da imagem foi utilizado o algoritmo do vizinho mais próximo. com base nas características espectrais das 4 bandas e do NDVI de cada objecto (médias e desvio padrão) e ainda foram consideradas outras duas variáveis, como o brilho e a máxima diferença para as 5 bandas. Esta última variável calcula a diferença entre o valor médio mínimo e médio máximo dentro do objecto comparando os valores entre todas as variáveis disponíveis. O algoritmo do vizinho mais próximo estima a densidade local de padrões de treino na vizinhança de um padrão desconhecido durante o processo de classificação.

Tabela 1. Matriz de confusão para a classificação considerando as 2 classes (indicada com fundo cinza) e as 3 classes. Erros de comissão (Co) e erros de omissão (Om) .

Figura 4. Classificação final

|                           | Pinus<br>Pinea | Quercus<br>Suber | Total<br>(2 classes) | Erro de Co<br>(2 classes) | Outros | Total<br>(3 classes) | Erro de Co<br>(3 classes) |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Pinus Pinea               | 16             | 3                | 19                   | 0.167                     | 1      | 20                   | 0.210                     |
| Quercus Suber             | 2              | 36               | 38                   | 0.053                     | 2      | 40                   | 0.100                     |
| Total (2classes)          | 18             | 39               | 57                   |                           |        |                      |                           |
| Erro de Om (2 classes)    | 0.118          | 0.077            |                      |                           |        |                      |                           |
| Outros                    | 2              | 1                |                      |                           | 87     | 90                   | 0.033                     |
| Total (3 classes)         | 20             | 40               |                      |                           | 90     | 150                  |                           |
| Erro de Om (3classes)     | 0.210          | 0.100            |                      |                           | 0.033  |                      |                           |
| Kappa (2 classes) = 79.3% |                |                  |                      |                           |        |                      |                           |
| Kappa (3 classes) = 86.5% |                |                  |                      |                           |        |                      |                           |

## Resultados:

A Figura 4 apresenta o resultado final do processo de segmentação e classificação, com identificação das espécies florestais. Para a avaliação da precisão do resultado obtido, utilizaram-se 150 pontos. Calculou-se a matriz de confusão e o coeficiente *Kappa*, para i) três classes florestais (*Quercus suber*, *Pinus pinea* o outros) e ii) duas classes (*Quercus suber e Pinus pinea*) onde a classe "outros" representa todos os restantes tipos de ocupação do solo (Tabela 1). No primeiro caso, verifica-se uma boa separação entre as três classes, com o coeficiente *Kappa* de 86.5% e uma exactidão global de 82.8%. Para a segunda situação, onde se considerou apenas a separação entre as duas espécies florestais dominantes, obteve-se um valor de *Kappa* satisfatório, *Kappa* = 79.3%, e uma exactidão global de 91.1%

## Conclusão:

O método de segmentação multi-resolução e classificação orientada a objecto com imagens Quickbird produz resultados bastante satisfatórios na identificação das espécies Quercus suber e Pinus pinea. Com o modo pan-sharpened das imagens Quickbird verificou-se que é possivel isolar facilmente a vegetação das outras classes de ocupação do solo para regiões de clima Mediterrâneo. Um fator de grande importância é a data de aquisição das imagens. Imagens registadas na época seca, permitem obter um maior contraste entre a vegetação arbóreo e o substracto, diminuindo os erros possíveis de confusão com vegetação arbustiva com maior vigor.