

*eréthica* ou *sthénica*, *febre inflammatoria* ou *hypersthénica* e *febre adynamica*, *asthénica* ou *typhoide*.

A forma *eréthica* declara-se em seguida a uma perturbação ligeira que affecta um organismo bem constituido. O abatimento, a prostração e outros phenomenos precursores são pouco definidos; a um frio moderado, muitas vezes imperceptivel, succede um calor egualmente moderado; o pulso cheio apresenta algumas pulsações a mais que no estado normal; a sêde não é intensa.

Esta forma pertence ás febres que teem a sua origem em lesões locais pouco graves, ou em causas ligeiras que perturbam o sangue e desenvolvem estes incommodos ephemeros que terminam no fim d'algumas horas ou d'alguns dias, ordinariamente por uma crise; ex. as *colicas ligeiras*, as affecções catarrhaes das ventas, ditas vulgarmente *constipações*, etc.

Uma febre *eréthica*, cuja perturbação local, que d'ella é o ponto de partida, ganha em estensão e intensidade, toma o nome de *inflammatoria*.—Esta é primitiva entre os animaes bem nutridos, d'uma forte constituição e affectados d'uma lesão local importante. E, quer ella se declare repentinamente, quer seja annunciada por *prodrômos* ou signaes precursores, esta forma apresenta o character d'uma combustão excessiva do organismo que denotam o calor da pelle, da bocca, do ar expirado e o ardor da sêde.

O pulso, muito acelerado, é forte, cheio ou pequeno, tenso e concentrado, o appetite nullo, o abatimento e peso da cabeça muito pronunciados, as secreções pouco abundantes. Esta forma de febre é a mais commum na especie cavallar

A forma *adynamica* é a partilha dos animaes fracos e mal nutridos, d'aquelles que soffrem doenças chronicas locais ou dos que a forma precedente tem debilitado.

Além d'estas condições, as febres *adynamicas* são ainda determinadas por miasmas, por *virus* e por reabsorpções *ichorosas* e putridas; causas que exercem uma acção paralytante sobre o systema nervoso.

As febres *adynamicas* reconhecem-se pelos symptomas seguintes: Calefrios passageiros seguidos d'um calor desigualmente repartido; o pulso acelerado, pequeno e fraco; as contracções do coração precipitadas, irregulares e mesmo intermittentes; a respiração umas vezes accelerada, outras moderada, outras ainda ruidosa ou sibilante; as mucosas apparentes, fortemente injectadas, apresentam *petéchias* (*manchas rôxas*) e uma côr acafroada, ou então pallidas, seccas ou cobertas de múco. Estes phenomenos se entremeiam tambem de suores frios, parciais. Os sedenhos e outras soluções de continuidade (feridas) suppurantes cessam de segregar; as chagas se transformam por vezes em ulceras de máu character.

Do lado do apparelho digestivo, a lingua se cobre de um indulto escuro com fendas na superficie; o gado bovino apresenta *meteorisação* (desenvolvimento de gazes no ventre) e gretas no focinho.

*Tratamento*.—No debute de qualquer febre e emquanto a doença, a que ella anda unida, se não declara, deve empregar-se um tratamento simplesmente hygienico, que consiste em: agasalho, repouso,