

Indicações uteis e praticas

Trigo de Riéti

Foi esta a variedade que tanto absoluta como relativamente, melhores resultados offereceu nãs culturas experimentaes, realisadas este anno em Portalegre.

Devemos dizel-o, a semente era uma das melhores e tanto que foi de todas as empregadas, a que na germinação deu menor numero de falhas.

A variedade de Riéti é originaria da Italia, conhecida pelas suas grandes e magnificas producções.

Convem aos paizes quentes e seccos; é pouco sujeita á invasão da ferrugem, mantem com constancia a fixidez dos seus caracteres.

Esta variedade pertence aos trigos molles (*triticum sativum*), espiga estreita, comprida, mas desegual, barbada; grão sobre o comprido, bem formado; palha alta e muito direita.

Tem o deffeito inherente á grande altura da palha e ao comprimento da espiga, munida de longas barbas — uma grande tendencia para acamar.

A gravura que acompanha o presente texto dá sufficiente idéa, da forma e dimensões, tanto do grão como da espiga.

O grão empregado pesou 0^k,828 por litro, contando-se n'este 14,220 sementes.

A sementeira muito tardia, por circumstancias inteiramente alheias á nossa vontade, virificou-se de 14 a 19 de janeiro.

Na sementeira em quadrado, de 20 centimetros de lado, na proporção de 25 sementes por metro quadrado, empregaram-se 14^k,420 de semente por hectare, correspondentes a 17^l,50.

Na sementeira a lanço, na proporção de 400 sementes por metro quadrado, empregaram-se 232^k,833 de semente por hectare, correspondente a 281^l,200.

As formulas e doses dos adubos empregados, foram as que constam a paginas 237, do presente numero do jornal.

Para maior simplicidade e evitar a repetição ameadada dos mesmos nomes, serão sempre designadas as differentes parcelas como seguidamente se inscrevem:

Sementeira em quadrado — I *Terra sem adubo*; II *Adubo chimico menos gesso*; III *Adubo chimico menos nitratos*; IV *Adubo chimico menos phosphoro*; V *Adubo chimico menos potassa*; VI *Adubo chimico completo*; VII *Estrume de curral*.

Sementeira a lanço — VIII *Terra sem adubo*; IX *Adubo chimico completo*; X *Estrume de curral*.

A floração notou-se desde 27 de maio até 8 de junho.