

O estado geral da vegetação foi notada como regular na maioria dos canteiros, com atraso nas parcelas I e VIII, com avanço nas VI e IX.

*Nascimentos e afilhamentos*

Designações	Parcelas										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Pés nascidos por metro quadrado.....	16	17	17	20	19	20	20	271	257	224	
Afilhamentos	(N.º medio....)	2,7	8,3	9,7	12,3	14,5	19,4	8,8	1,6	2,4	2,0
	(N.º maximo....)	11	37	27	38	33	37	19	9	16	10

A ferrugem que atacou com grande intensidade outras variedades, n'esta registou-se com pouca e sómente nas parcelas I, II, V, VI, VII e VIII.

Por effeito de chuvas acompanhadas de ventos, em 2 de junho observou-se um tanto acamada a parcella IX.

Em 25 do mesmo mez pelas mesmas causas, acamaram pouco as parcelas I, II, III, VII, VIII, e X; acamaram muito as parcelas IV, V, VI e IX.

Pelo seguinte quadro poderá formar-se uma idéa do differente desenvolvimente da vegetação segundo as parcelas:

Designações	Parcelas										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Altura das plantas	(Maxima.....)	1,35	1,25	1,30	1,30	1,35	1,45	1,25	1,10	1,35	1,20
	(Minima.....)	0,65	0,55	0,60	0,70	0,90	0,75	0,85	0,40	0,55	0,55
	(Media.....)	1,00	0,90	0,95	1,00	1,12	1,10	1,05	0,75	0,95	0,87

(Continua.)

R. M.



## Variedades

### *Tratamento das feridas dos vegetaes*

Importa sempre preservar do contacto do ar as feridas dos vegetaes, quer sejam accidentaes ou resultantes da póda e enxertia.

A formula seguinte recommendada por A. Du Breuil, no seu *Curso d' Arboricultura*, já por nós tem sido empregada com bom exito.

As proporções são relativas a 100 de peso.

Pez negro.....	28
Pez de Borgonha.....	28
Cera amarella.....	16
Sebo.....	14
Cinzas peneiradas.....	14

Applica-se por meio de um pincel. Deve empregar-se sufficientemente quente para estar liquida, mas não tanto que possa alterar os tecidos das plantas.