

inho que se diz que os fizeram e grandes.
As vinhas continuam a perder-se pelo ataque da phylloxera e o seu aspecto no geral é mau.

Os olivares tem apparencia satisfactoria por partes.
Os gados acham-se a mais de meias carnes.



Indicações uteis e praticas

Trigo Noé ou Azul

(Continuado do n.º 11—paginas 348)

Pelo seguinte quadro poderá formar-se uma idéa do differente desenvolvimento da vegetação segundo as parcellas, correspondentes ás differentes formulas dos adubos empregados:

Altura das plantas segundo a formula do adubo empregado

Designações	Parcellas										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Altura das plantas	Maxima	1,05	1,40	1,30	1,10	1,17	1,20	1,15	1,15	1,20	1,05
	Minima	0,55	0,70	0,75	0,60	0,75	0,55	0,90	0,75	0,65	0,60
	Média	0,80	1,05	1,02	0,85	0,91	0,87	1,02	0,95	0,92	0,82

O amadurecimento teve lugar de 8 a 10 de julho, notando-se primeiro nas parcellas correspondentes á sementeira a lanço, que tambem se verificou mais cedo.

A colheita realisou-se em 20 do mesmo mez para a sementeira a lanço e a 22 para a em quadrado.

O numero, desenvolvimento e contextura das espigas consta do seguinte mappa:

Designações	Parcellas										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
N.º de espigas por pé	Médio	4,1	10,4	8,0	8,1	—	8,6	7,1	1,5	1,7	1,3
	Maximo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comprimento das espigas (centimetros)	Médio	0,07	0,08	0,08	0,90	0,80	0,09	0,06	0,05	0,07	0,08
	Maximo	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,13	0,09	0,09	0,08	0,10
N.º de grãos por espiga	Médio	33	34	40	30	28	30	27	25	19	25
	Maximo	60	51	58	49	45	45	45	36	27	52